


**สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
อำเภอฝักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำเดือน มีนาคม 2566**

1.อันดับโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง


1.1 อันดับจำนวนผู้ป่วย ประจำเดือน มีนาคม 2566

งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลฝักไห้ ได้รับรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566 ตามอันดับจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงาน ดังนี้



1.2 อันดับจำนวนผู้ป่วยสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566-31 มีนาคม 2566 เรียงตามอันดับจำนวนผู้ป่วยสะสม ดังนี้




2.สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่สำคัญ

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลฝักไถ่ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) จำนวน 155 ราย อัตราป่วย 394.44 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 102 ราย เพศชาย 53 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1.92 : 1

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี จำนวนผู้ป่วย 35 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี, 35-44 ปี, 45-54 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 55-64 ปี, 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 10-14 ปี จำนวนผู้ป่วย 22, 19, 17, 16, 14, 13, 11 และ 8 ราย ตามลำดับ




พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มีนาคม จำนวนผู้ป่วย 57 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 49 ราย กุมภาพันธ์ 49 ราย มีนาคม 57 ราย



พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 88 ราย ร้อยละ 56.77 ในเขตองค์การบริหารตำบล 67 ราย ร้อยละ 43.23 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน 155 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตำบล ตาลาน อัตราป่วย 1,120.28 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา (19ราย) คือ ตำบล บ้านใหญ่(13ราย), ตำบล อมฤต(9ราย), ตำบล หนองน้ำใหญ่(26ราย), ตำบล ท่าดินแดง(9ราย), ตำบล ผักไห้(16ราย), ตำบล กุฎี(10ราย), ตำบล ลาดชิด(15ราย), ตำบล ลาดน้ำเค็ม(9ราย), ตำบล หน้าโคก(8ราย), ตำบล จักราช(6ราย), ตำบล นาคู(6ราย), ตำบล โคกช้าง(3ราย), ตำบล ดอนลาน(2ราย), ตำบล บ้านแค(3ราย), ตำบล ลำตะเคียน(1ราย), อัตราป่วย 618.75, 471.2, 470.08, 451.81, 447.05, 436.68, 428.08, 413.22, 357.14, 296.15, 292.4, 186.1, 93.68, 92.05, 83.96 ตามลำดับ



ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูล เดือน มีนาคม 2566 พบรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 57 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยในเดือนนี้น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงสะสมอยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี มากที่สุด (35ราย) ตำบลที่พบอัตราป่วยสะสมสูงสุด คือ ตำบล ตาลาน อัตราป่วย 1120.28 ต่อประชากรแสนคน (19ราย)


ในปัจจุบันมีปัจจัยการเกิดโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจึงต้องได้รับความร่วมมือ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะท้องถิ่นควรมีบทบาทตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดำเนินงานออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และการบังคับใช้ กฎกระทรวงสุขภาพลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 เชื่อมโยงกับการพิจารณามาตรการในการขออนุญาตประกอบกิจการหรือแจ้งประกอบกิจการของท้องถิ่น รวมถึงการสร้างความตระหนัก ให้ความรู้/อบรมของท้องถิ่น โรงเรียนอสม. ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลผักไห้ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) จำนวน 33 ราย อัตราป่วย 83.98 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 18 ราย เพศหญิง 15 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง 1.20 : 1

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป จำนวนผู้ป่วย 23 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี, 0-4 ปี, 35-44 ปี, 45-54 ปี, 15-24 ปี, 25-34 ปี, 10-14 ปี และ 5-9 ปี จำนวนผู้ป่วย 3, 3, 2, 1, 1, 0, 0 และ 0 ราย ตามลำดับ




พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน กุมภาพันธ์ จำนวนผู้ป่วย 13 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 8 ราย กุมภาพันธ์ 13 ราย มีนาคม 12 ราย



พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 9 ราย ร้อยละ 27.27 ในเขตองค์การบริหารตำบล 24 ราย ร้อยละ 72.73

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน 33 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตำบล ลาดชิด อัตราป่วย 285.39 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา(10ราย) คือ ตำบล ลำตะเคียน(2ราย), ตำบล นาคู(3ราย), ตำบล ตาลาน(2ราย), ตำบล อมฤต(2ราย), ตำบล หน้าโคก(2ราย), ตำบล หนองน้ำใหญ่(4ราย), ตำบล โคกช้าง(1ราย), ตำบล บ้านแค(2ราย), ตำบล ท่าดินแดง (1ราย), ตำบล บ้านใหญ่(1ราย), ตำบล ดอนลาน(1ราย), ตำบล ลาดน้ำเค็ม(1ราย), ตำบล กุฎี(1ราย), ตำบล จักราช (0ราย), ตำบล ฝักไถ่(0ราย), อัตราป่วย 167.93, 146.2, 117.92, 104.71, 89.29, 72.32, 62.03, 61.37, 50.2, 47.6, 46.84, 45.91, 43.67, 0, 0 ตามลำดับ




ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ

เดือน มีนาคม 2566 พบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 12 ราย สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โดยพบผู้ป่วยสะสม ในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป มากที่สุด จำนวน 23 ราย ตำบลที่มีอัตราป่วยสะสมมากที่สุด ในพื้นที่ ต.ลาดชิด อัตราป่วย 285.39 ต่อประชากรแสนคน (10ราย)

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลผักไห่ ไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต



ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดได้ตลอดปี มีรายงานผู้ป่วยส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในช่วงกลางปีฤดูฝนต่อไปถึงฤดูหนาว ทุกคนควรเอาใจใส่ป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แก่ หญิงมีครรภ์ เด็ก ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ โรคอ้วน เป็นต้น ควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี ผู้ป่วยที่มี

อาการสงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ (มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการอื่นๆ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยตามข้อ) หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา


สสจ.พระนครศรีอยุธยา มีแนวทางและมาตรการให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการแจ้งสถานการณ์เฝ้าระวังข้อมูล ILI (อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่) และดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ บูรณาการในการป้องกันโรคโควิด-19 เช่น การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ บ่อยๆ ปิดปากปิดจมูก เมื่อไอจาม กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกัน เป็นต้น และประสานให้ อสม.ในพื้นที่แนะนำให้ความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หากพบผู้ป่วยตามค่านิยามโรคไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลผักไห่ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 5.09 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศชาย 2 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพศหญิง

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี จำนวนผู้ป่วย 1 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี, 65 ปีขึ้นไป, 45-54 ปี, 35-44 ปี, 25-34 ปี, 15-24 ปี, 5-9 ปี และ 0-4 ปี จำนวนผู้ป่วย 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 และ 0 ราย ตามลำดับ




พบผู้ป่วย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 1 ราย กุมภาพันธ์ 0 ราย มีนาคม 1 ราย



พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 2 ราย ในเขตองค์การบริหารตำบล 0 ราย

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 1 ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ 1 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตำบล ตาลาน อัตราป่วย 58.96 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา (1ราย) คือ ตำบล บ้านใหญ่(1ราย), ตำบล หน้าโคก, ตำบล ลาดชิด, ตำบล หนองน้ำใหญ่, ตำบล จักราช, ตำบล โคกช้าง, ตำบล ลำตะเคียน, ตำบล กุฎี, ตำบล นาคู, ตำบล ดอนลาน, ตำบล ท่าดินแดง, ตำบล ลาดน้ำเค็ม, ตำบล บ้านแค, ตำบล อมฤต, ตำบล ผักไห้, อัตราป่วย 47.6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ตามลำดับ



ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ

เดือน มีนาคม 2566 พบรายงานผู้ป่วย 1 ราย มีจำนวนผู้ป่วยเท่ากับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกสะสมอยู่ในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (1ราย) และ 10-14 ปี (1ราย) ตำบลที่พบอัตราป่วยสะสมสูงสุดที่สุด คือ ตาลาน (1ราย) อัตราป่วย 58.96 ต่อประชากรแสนคน

การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาในภาพรวมของระดับพื้นที่ควรมีการดำเนินการทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบลอำเภอลำดับความสำคัญของปัญหาและประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถวางแผนกำหนด มาตรการและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ที่ผ่านมาปี 2562 พบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ยังคง พบปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่มีค่า HI,CI สูงมีขยะแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งน้ำขัง ภาวะ โลกร้อน ปัจจัยบุคคล เช่น พฤติกรรม ความรู้ประชาชน การไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค รวมถึง ปัจจัยอื่นๆที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น คมนาคม การเมือง กฎหมาย การออกและการบังคับใช้ข้อกำหนดของท้องถิ่น ข้อจำกัดและประสิทธิภาพในการพนเคมีกำจัดขยะ และที่สำคัญ คือ การไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรค รวมถึง การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชุมชนส่วนใหญ่มีแนวคิดว่าการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านไม่ใช่หน้าที่ของตน ความไม่ ตระหนักของชุมชน จึงส่งผลให้มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูง มีขยะ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะสถานที่ที่คน อยู่รวมกันมากๆ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น จึงควรสร้างความตระหนัก และขอความร่วมมือของชุมชนและเครือข่าย ทุกภาคส่วนต่อไป หรือท้องถิ่นอาจพิจารณากำหนดเทศบัญญัติ/ข้อบังคับท้องถิ่น และการบังคับใช้ เพื่อกำหนด มาตรการกระตุ้นให้ชุมชนร่วมมือในการจัดการบ้าน/หน่วยงานตนเองมากขึ้น

การป้องกันโรคล่วงหน้าโดยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งภายในบ้านและรอบบ้านช่วงเวลาสำคัญที่ ควรดำเนินการคือช่วงเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปีเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่โอกาสการแพร่โรคเกิด น้อยที่สุดและจะส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วยที่อาจเกิดมากขึ้นในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-สิงหาคม) ควรประสานผู้นำชุมชน โรงเรียนราชการส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ และควรแจ้งสถานการณ์โรค รวมถึงให้ข้อมูลความรู้ณรงค์เรื่องการ ป้องกันและควบคุมโรคของโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) ป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก, ไข้ซิกา, โรคชิคุนกุนยา และการปฏิบัติตัวในผู้ป่วย ไม่ให้ยุงกัด รณรงค์ขอความร่วมมือแต่ละบ้านใน การช่วยเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย เร่งสร้างเครือข่ายในการร่วมมือดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการระบาดโดยให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยทุกรายแม้ว่าเป็นรายที่สงสัยหรือเกิดโรคนอกช่วงฤดูการระบาดโดยต้องดำเนินการควบคุมลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัยพร้อมกันและติดตามสถานการณ์ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของทีมควบคุมโรค ในระดับพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงหรือเสี่ยงสูงเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยันโรคไขเลือดออกแจ้งรายงานให้กับทีมควบคุมโรค และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากพบผู้ป่วยเพื่อเร่งรัดดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเร่งด่วน การควบคุมโรคในพื้นที่ให้รีบดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้ง และให้กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยสำรวจภาชนะขังน้ำบริเวณบ้านผู้ป่วยและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน

ทีม SRRT ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ 3 -3 -1 ให้ควบคุมโรคสำเร็จโดยเร็ว ตามมาตรฐาน ใน 28 วัน เมื่อพบผู้ป่วย รวมถึงการจัดทำรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น หากควบคุมไม่สำเร็จ ต้องทำ War room ระดับอำเภอ เพื่อวางแผนแนวทางควบคุมโรคโดยเร็ว เมื่อทำการสอบสวนโรคแล้ว หากพบว่าผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา กับผู้ป่วยรายอื่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการแจ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบเพื่อประสานงานในลำดับต่อไป กรณีระบาดในพื้นที่มากกว่า 25% เปิด EOC ตามเกณฑ์มาตรฐาน

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก (Hand, foot and mouth disease)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลผักไห่ ได้รับรายงานผู้ป่วย โรคมือเท้าปาก (Hand, foot and mouth disease) จำนวน 1 ราย อัตราป่วย 2.54 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศชาย 1 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพศหญิง


กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วย 1 ราย

พบผู้ป่วยในเดือนมกราคม 1 ราย

พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 1 ราย

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน 1 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตำบล ตาลาน อัตราป่วย 58.96 ต่อประชากรแสนคน



ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ

เดือน มีนาคม 2566 ไม่มีรายงานผู้ป่วย โดยในเดือนนี้ มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0-5 ปี (1ราย) ตำบลที่พบอัตราป่วยสะสมสูงสุด คือ ตาลาน (1ราย) อัตราป่วย 58.96 ต่อประชากรแสนคน

โรคมือเท้าปาก มักพบการระบาดช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปีจากการสอบสวนโรคที่ผ่านมา. ผักไห้ พบแหล่งโรคที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในโรงเรียน เครื่องเล่นบ้านลูกบอลบ้านลมตามตลาดนัด จึงควรกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันโรค แจ้างเตือนอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลระบาดโดยเฉพาะ ราชการส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากมีเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากควรประสานครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ในช่วงฤดูกาลระบาดเพื่อร่วมเฝ้าระวังและตรวจจับโรคได้ทันและแจกเอกสารความรู้การป้องกันโรคมือเท้าปากให้ผู้ปกครองเด็กทุกคนรวมทั้งขอความร่วมมือให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องเล่นของใช้ของเด็กเป็นประจำและช่วยตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้าดูตุ่มที่มือเท้าและปากของเด็กหรือมีไข้หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กและให้ผู้ปกครองรีบตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแนะนำให้หยุดเรียน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดทันทีและพื้นที่ที่พบผู้ป่วยหลายรายติดต่อกันใน ๑ - ๒ สัปดาห์ควรเพิ่มมาตรการดังนี้

๑. อำเภอควรแจ้งเตือนเครือข่ายระดับตำบลให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเป็นประจำ

๒. ขอให้โรงพยาบาลและรพ.สต. ทุกแห่งเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีที่มารับการรักษา

๓. หากเข้าข่ายสงสัยให้รีบแจ้งทีมป้องกันควบคุมโรคระดับอำเภอและระดับตำบลร่วมสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่โดยเร็วและรพ.สต. ทุกแห่งแจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขท้องถิ่น เฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กชั้นอนุบาล แนะนำให้เด็กป่วยอยู่กับบ้าน

๔. ประสานครูในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและราชการส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือหากมีเด็กป่วยและมีการปิดชั้นเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางแจ้งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรายงานจังหวัดทราบทันทีและประสานราชการส่วนท้องถิ่นผู้มาขออนุญาตเปิดตลาด ที่มีเครื่องเล่นบ้านลูกบอลในการทำความสะอาดดังกล่าวเป็นประจำ

งานระบาดวิทยา

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรรวม โรงพยาบาลผักไห้

สรุปรายงาน วันที่ 7 เมษายน 2566

หมายเหตุ ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นำมาจากกรง.506 เฉพาะที่โรงพยาบาลผักไห้ ได้รับรายงานเท่านั้น สำหรับฐานข้อมูลประชากรระดับอำเภออ้างอิงจากงานระบาดสสจ.พระนครศรีอยุธยา โดยการดำเนินการกรณีโรคจะใช้วันเริ่มป่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายจำแนกตามบุคคล เวลาสถานที่ และมีการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน ความทันเวลา ความซ้ำซ้อนของข้อมูลอย่างต่อเนื่องข้อมูลจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ จึงขอให้พิจารณาข้อมูลในสถานการณ์ล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบัน